

# Nieuwsbrief Rundvee

## Tijd voor winterbanden!

De (meeste) maïs ligt weer onder het zeil en het land is zo goed als winterklaar. De spoorwegen kampen weer met bladeren op de rails en het wordt hoog tijd om uw winterbanden onder de auto te schroeven. Dit betekent echter ook dat het tijd wordt het vee winterklaar te maken. Daarom een aantal tips:

- Als het echt koud wordt (rond het vriespunt) hebben nuchtere kalfjes een hogere behoefte aan energie om zichzelf warm te houden. Verhoog de melkgift daarom met 10%.
- Zorg dat de kalfjes op een beschutte plaats kunnen liggen op een dik pak droog stro. Maak evt. een extra plafonnetje waaronder de kalfjes beschut kunnen liggen.
- Scheer de vacht van ouder jongvee. (in ieder geval op de rug). Hierdoor kunnen dieren overtollige warmte goed kwijt. Wanneer ze niet worden geschoren gaan de dieren zweten en krijgen een natte vacht. Dit kun je controleren door je hand op de rug van de dieren te leggen.
- Controleer de ventilatie. Er moet voldoende luchtverversing zijn voor de aanvoer van zuurstof en afvoer van schadelijke stoffen (Koolzuur en Ammoniak), maar tegelijkertijd moeten de kalfjes niet in de tocht liggen.
- Vaccineren tegen de belangrijkste luchtweginfecties is vaak erg zinvol; zeker bij dieren jonger dan 1 jaar oud.
- Bij nat herfst/winterweer wordt het ook in de stal snel vochtig. Strooi daarom de ligboxen wat vaker in om bijvoorbeeld uiergezondheidsproblemen en klauwproblemen voor te zijn.

## Masterclass IBR / BVD

Op maandagmiddag 18 november organiseert de Gezondheidsdienst een bijeenkomst voor veehouders over het beheersen van IBR en BVD in Zaal Verploegen in Wijchen. Gezien de uitbraken van beide ziekten in de laatste periode is dit misschien voor u ook een interessante bijeenkomst. Aanmelden via <http://www.gddeventer.com/rund/gd%20melkmeesters/masterclasses>. Deze bijeenkomst is gratis voor deelnemers aan GD Melkmeesters.

## Wanneer 1e of 2e keuze antibiotica?

In principe mag u zieke dieren alleen behandelen met een 1<sup>e</sup> keuze antibiotica die staat vermeld in uw bedrijfsbehandelplan. Behandel altijd volgens uw behandelplan. Wanneer u twijfelt of u wel de juiste behandeling kiest, kunt u beter even contact opnemen met uw dierenarts.

Wanneer mag u wel een 2<sup>e</sup> keuze antibioticum inzetten?

- Voor een aantal indicaties bestaan geen 1<sup>e</sup> keuze middelen. Bijvoorbeeld uierinjectoren voor mastitis.
- Als een 1<sup>e</sup> keuze antibioticum niet werkt. Dit moet wel goed onderbouwd worden. Bijvoorbeeld op basis van bacteriologisch onderzoek. Dit is echter niet altijd mogelijk.
- Wanneer een 1<sup>e</sup> keuze antibioticum niet na 24-48 uur tot verbetering van het zieke dier leidt, kan er in bepaalde gevallen in overleg met een dierenarts gekozen worden voor een 2<sup>e</sup> keuze antibioticum. Er zal echter wel per individueel geval eerst met een 1<sup>e</sup> keuze antibioticum moeten worden begonnen en er zal goed beargumenteerd moeten worden waarom een 1<sup>e</sup> keuze middel niet lijkt aan te slaan. En dit zullen zo objectief mogelijke criteria moeten zijn (zoals bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur of bepaalde ziektesymptomen). Zorg dus dat u deze gegevens vastlegt en regelmatig de lichaamstemperatuur opneemt.